

RELICAL®



Fungicida

Fungicida amplio espectro para lanchas, mildius y pudriciones

INGREDIENTE ACTIVO:

Dimetomorf.....300 g/l
Cimoxanil.....50 g/l

MODO DE EMPLEO: Para preparar la mezcla, se recomienda agregar la cantidad requerida de **RELICAL®** directamente al tanque conteniendo agua y en movimiento constante, hasta formar una mezcla homogénea.

Consulte con un Ingeniero Agrónomo.

INGRESO AL ÁREA TRATADA: 3 horas después que se haya secado la pulverización, con el equipo de protección y 6 horas después que se haya secado la pulverización, sin equipo de protección.

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD: Por la gran cantidad de variedades ornamentales existentes en el mercado es necesario hacer pruebas de fitotolerancia antes de realizar mezclas y aplicaciones en gran escala.

AVISO AL COMPRADOR: El fabricante garantiza la composición y calidad del producto. No se responsabiliza por el uso imprudente, excesivo o indebido por parte del consumidor.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA: Categoría II.

PRECAUCIONES: El producto es peligroso en caso de inhalación e ingestión. Irritante para los ojos y la piel. Durante la preparación y utilización del producto. **NO COMER, BEBER O FUMAR.**

Evitar: la inhalación e ingestión de la sustancia nebulizada, así como el contacto del producto con la boca, los ojos y la piel.

Usar: Ropa protectora adecuada, gafas, mascarilla, guantes y botas. Antes de comer, beber o fumar, sacarse la ropa contaminada y

lavarse bien las partes expuestas de la piel con abundante agua.

FRASES DE ADVERTENCIA: **RELICAL®** es ligeramente tóxico para los peces; por lo tanto, no contaminar arroyos, ríos, estanques o lagos con productos químicos de desecho o envases vacíos.

“Conservar el producto en su envase original etiquetado y cerrado herméticamente, lejos de las bebidas y los alimentos para las personas y los animales”. No emplear este envase para ningún otro fin. Eliminarlo de manera segura. “En caso de derrame, recoger el producto mezclándolo con tierra o aserrín”.

INSTRUCCIONES PARA PRIMEROS AUXILIOS Y CONSEJOS PARA LOS MÉDICOS:

En caso de ingestión no provocar el vómito. No administrar grasas (leche, aceite) o alcohol, los cuales pueden acelerar la absorción. Suministrar carbón medicinal activado. En caso de inhalación apartar al accidentado inmediatamente de la zona de peligro y suministrarle aire puro. De ser necesario realizar respiración artificial. En caso de contaminación de los ojos, lavarse inmediatamente con abundante agua durante 15 minutos. Si entra en contacto con la piel, b añarse con abundante agua y jabón. Despojarse de la ropa contaminada. En caso de inconsistencia, llevar al paciente al médico y mostrarle esta etiqueta.

SÍNTOMAS: Alteraciones del sistema nervioso central, irritaciones en la piel, los ojos y las vías respiratorias.

DIAGNÓSTICO: Se desconocen pruebas específicas para el diagnóstico.

TRATAMIENTO: Efectuar la descontaminación con tratamiento de soporte y sintomático. No existe antídoto específico.

PRESENTACIONES:

Frasco x 1 litro.
Frasco x 100 ml.
Frasco x 200 ml

REGISTRO NORMA ANDINA: 177-F1/NA

ELABORADO POR: GOLDEN HARVEST CHEMICAL CO. LTD.

DISTRIBUIDO POR: AGROQUÍM C. LTDA.

INSTRUCCIONES DE USO RELICAL®:

CULTIVO	ENFERMEDADES		DOSIS ml/200l	FRECUENCIA DE APLICACIÓN
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO		
SOLANÁCEAS Papa, tomate, pimiento, ají, tabaco, naranjilla.	Lancha negra Tizón temprano	<i>Phytophthora</i> sp. <i>Alternaria</i> sp.	200	7 a 14 días.
LEGUMINOSAS Haba, arveja, soya, fréjol.	Mildiu veloso Lancha negra	<i>Peronospora</i> sp. <i>Phytophthora</i> sp.	200	7 a 14 días.
ORNAMENTALES Rosa, clavel, gypsophilla, flores de verano.	Mildiu veloso Podredumbres	<i>Peronospora</i> sp. <i>Pythium</i> sp.	0, 8 - 1, 0 ml/l	Durante todo el ciclo vegetativo vía foliar o drench.
HORTALIZAS Cebolla, ajo, zanahoria, lechuga, cilantro, espárrago.	Mildiu veloso	<i>Peronospora</i> sp.	200	Aplicar de 2 a 3 veces durante el ciclo vegetativo.
CRUCÍFERAS Col, coliflor, brócoli, nabo	Manchas foliares	<i>Alternaria brassica</i>	200	14 a 21 días.
CUCURBITÁCEAS Melón, sandía, calabacín, pepino, zapallo.	Mildiu veloso	<i>Pseudoperonospora cubensis</i>	200	7 a 14 días.
FRUTALES Manzano, durazno, tomate árbol, aguacate, piña, maracuyá, café, uva, fresa, babaco.	Lancha negra Pudrición corona	<i>Phytophthora</i> sp. <i>Peronospora</i> sp.	200	7 a 14 días.
GRAMÍNEAS Maíz, trigo, arroz, caña de azúcar.	Tizones	<i>Rhizoctonia</i> sp. <i>Pythium</i> sp.	200	7 a 14 días.